

自制地榆炭散为主治疗 烧伤 105 例

湖北省监利县第二人民医院(湖北 433325)

李卫红 李 平

1986~1995 年,我们采用自制地榆炭散为主治疗烧伤 105 例,疗效佳,报告如下。

临床资料 本组 105 例中男 67 例,女 38 例;年龄 8 个月~73 岁;烧伤面积 7%~89%,根据三度四分法分度标准,Ⅰ度~浅Ⅱ度 50 例,深Ⅱ度 52 例,Ⅲ度 3 例;烧伤后接受治疗时间为 5~102h,平均 17h;烫伤 38 例,火烧伤 67 例;创面感染 29 例,休克 18 例,其中严重休克 2 例。

治疗方法 创面处理:均不作清创。(1)对Ⅰ度、浅Ⅱ度和轻度感染者,水泡不刺破,开放创面,每日 4~8 次用鹅毛或毛笔蘸地榆黄连麻油膏(处方:地榆炭 500g 黄连 100g 麻油适量,制作:将上药混合碾细过 20 目筛,用麻油调匀呈糊状,消毒后即可使用)涂擦。经上述处理,一般一天后创面渗出止,并很快形成一层痂膜。(2)对于渗出仍不止和深Ⅱ度以上处用地榆黄连青黛秀油膏(处方:地榆炭 500g 黄连 100g 青黛 50g 秀油(桐油)适量,制作同上),均匀涂于无菌纱布上复盖创面,每日更换 1 次,3~5 天渗出好转后改用(1)法。(3)对于渗出物仍不止和Ⅲ度创面,改开放,地榆黄连青黛秀油膏涂擦与地榆黄连青黛粉(基本方:地榆炭 14g 黄连 10g 炉甘石 35g 雄黄 18g 冰片 12g 大黄 18g 青黛 35g;加减:臭气重加硼砂 10g;创面发痒加轻粉 5g,蝉衣 18g,薄荷 10g;渗出物多时地榆炭用量可加倍。制作同上。用法:洒在创面上)交替使用,每日 6~10 次,创面一般在 3~5 天渗出减少,形成一层痂膜。全身情况好转后,揭去痂膜,改用(1)法。

无休克者,每日内服生绿豆水(生绿豆 250g,捣碎,加温开水 1000ml 浸泡 1h,取浸泡液当茶饮)500~1000ml,休克者可多饮,绿豆渣煮粥食用。对深Ⅱ度以上烧伤者另加服玄明饮加椒目(处方:玄参 15g 黄连 5g 黄芩 10g 花粉 10g 金银花 30g 牛蒡子 10g 甘草 5g 椒目 16 粒)每日 1 剂煎服,至病情好转。创面有感染者应用抗生素。

对于出现休克的患者,输液保持体液代谢平衡,必要时输血及白蛋白,维持肾功能,并减少创面的渗出。

结 果 根据《病种质量控制标准》(试行草案,中华人民共和国卫生部 1992:81,84),显效(创面 5~10 天愈合,平均 7 天,无疤痕)69 例(65.7%);有效(创面

11~35 天愈合,平均 20 天,感染处留有疤痕)35 例(33.3%);无效 1 例(1.0%)。住院时间 4~88 天,平均 12.58 天。

体 会 中医外用药可以减少创面的渗出。每日用鹅毛蘸地榆黄连麻油膏涂擦创面数次之后,便形成一层黑色的痂膜,起到保护创面,减少渗出的作用。涂药后,患者自觉创面剧痛减轻。方中所用地榆、黄连、青黛、炉甘石、雄黄、冰片、大黄等都是苦寒、苦凉药,具有清热泄火、解毒、燥湿、收敛等作用,并具有较强的抗菌作用。实践证明,外用治疗烧伤是有效的。

《隋息居饮食谱》称“绿豆甘凉,煮食清肌养胃,解渴止泻,利小便”。《开宝本草》曰“生研绞汁服,治丹毒,烦热,风疹,药石发热,热气奔腾”。我们体会:生绿豆水有清热解毒,止渴利尿作用,患者每日饮 500~1000ml 有弥补体液不足,其渣煮粥吃,可增加热能,达到早期利尿,防止肾功能衰竭,并增强机体对感染的控制,对烧伤治疗有一定的作用。

(收稿:1996-07-03 修回:1997-01-20)

中药外用治疗滴虫性及 霉菌性阴道炎

青岛市中医医院(山东 266012)

于青云 吴丽君

1993 年 10 月~1995 年 10 月,我们用龙胆泻肝汤加味外洗配合阴道内放药治疗滴虫性、霉菌性阴道炎 160 例,并与单用灭滴灵、制霉菌素治疗的 160 例作对照观察,疗效满意,报道如下。

临床资料 所有患者均经阴道分泌物涂片查见毛滴虫或芽孢和假菌丝者。320 例随机分为两组,中药组 160 例,年龄 19~60 岁,平均 31 岁;病程 4 天~2 年,平均 30 天;其中滴虫性及霉菌性阴道炎各 80 例。对照组 160 例,年龄 20~61 岁,平均 34 岁;病程 4 天~1.5 年,平均 29 天;其中滴虫性及霉菌性阴道炎各 80 例。临床表现均为白带增多,色白或黄,伴外阴瘙痒。

治疗方法 中药组均采用龙胆泻肝汤加味煎剂外洗。药物组成:龙胆草、黄芩、当归、生地、车前子、木通、泽泻、山栀子、花椒、艾叶各 12g,柴胡、甘草各 6g,土茯苓 30g。每日 1 剂,布包水煎 30min,趁热熏洗外阴及坐浴 20min,每日 2 次;栓剂:用黄柏、青黛各 30g,珍珠粉 2g,冰片 5g,研细粉分装 28 个胶囊中,于熏洗后自行放入阴道,早晚各 1 粒。对照组:滴虫性阴道炎者采用灭滴灵(安徽宣州市制药厂生产)0.2g,阴道内放药,每晚 1 次;霉菌性阴道炎者采用制霉菌素(上海中国信谊