佐剂性关节炎大鼠的血常规

于飞¹, 张浪^{2,3}, 梁青², 傅晟², 张骏¹, 吕昕泽², 方珍文⁴

- (1. 天津市临床药物关键技术重点实验室, 天津医科大学药学院, 天津 300070;
2. 天津国际生物医药联合研究院, 天津 300457;
3. 南开大学药学院, 天津 300071; 4. 广西食品药品检验所, 广西 530021)

【摘要】 目的 分析并探讨佐剂性关节炎大鼠的血常规。方法 采用完全弗氏佐剂诱导 Wistar 大鼠出现关节炎, 全自动血液分析仪检测血常规。结果 27 个血常规检测指标中, 与正常大鼠比较, 佐剂性关节炎大鼠有 14 个指标有显著性差异 ($P < 0.05$), 分别为白细胞数、中性粒细胞数(比例)、淋巴细胞比例、单核细胞数、网织红细胞数(包括高、中、低荧光强度和未成熟的)以及红细胞平均体积、平均血红蛋白量、红细胞分布宽度标准差和变异系数。结论 佐剂性关节炎大鼠白细胞明显上升, 会出现类似于人类风湿性关节炎的慢性病性贫血。

【关键词】 佐剂性关节炎; 大鼠; 血常规

【中图分类号】 R965, R967, R332 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1671-7856(2014) 01-0005-03

doi: 10.3969/j.issn.1671.7856.2014.001.002

Blood routine of adjuvant arthritis rats

YU Fei¹, ZHANG Lang^{2,3}, LIANG Qing², FU Sheng², ZHANG Jun¹, LU Xin-ze², FANG Zhen-wen⁴

- (1. Tianjin Key Laboratory on Technologies Enabling Development of Clinical Therapeutics and Diagnostics, Pharmacy College of Tianjin Medical University, Tianjin 300070, China;
2. Tianjin International Joint Academy of Biotechnology & Medicine, Tianjin 300457, China;
3. College of Pharmacy, Nankai University, Tianjin 300071, China;
4. Guangxi Institute for Food and Drug Control, Guangxi 530021, China)

【Abstract】 Objective To analyze blood routine in adjuvant arthritis rats. **Methods** Complete Freund's adjuvant-induced arthritis models were established in Wistar rats, and detection of blood routine was carried out by the automatic blood analyzer. **Results** Compared to normal rats, 14 blood test indicators were significantly different in adjuvant-induced arthritis rats. **Conclusion** The leukocytes count was significantly increased in adjuvant-induced arthritis rats, and anemia of chronic disease similar to people rheumatoid arthritis appeared.

【Key words】 Adjuvant arthritis; Rats; Blood routine

大鼠佐剂性关节炎 (adjuvant-induced arthritis, AIA) 模型是研究类风湿性关节炎 (rheumatoid arthritis, RA) 及抗 RA 药效评价常用的一种动物模型^[1]。目前, 关于 AIA 模型的研究主要集中于探讨

关节病理过程与疾病机制, 对于关节外的血常规等生理指标的研究较少。本文对 AIA 大鼠的血常规指标进行分析探讨, 旨在为 RA 的研究提供参考。现报告如下。

[基金项目] 天津市科技计划项目创新园专项(13ZCZDSY03000)。

[作者简介] 于飞(1981-), 女, 博士, 研究方向: 药理学。E-mail: yufeitianjin@163.com。

[通讯作者] 方珍文(1974-), 女, 主管药师, 研究方向: 药品的生物学评价。E-mail: fzw1116@163.com。

1 材料和方法

1.1 实验材料

完全弗氏佐剂 (complete freund's adjuvant, CFA), 购于 sigma 公司。SPF 级 Wistar 大鼠, 雄性 40 只, 体重 200 ± 20 g, 购于军事医学科学院实验动物中心, SCXK(军)2007-004。

1.2 佐剂性关节炎模型建立

Wistar 大鼠随机分成对照组和模型组, 各 20 只。模型组大鼠右后足趾皮内注射 0.1 mL CFA, 对照组大鼠同部位注射等量生理盐水。注射后每隔 4 d 评价关节炎严重程度, 评分标准^[2]如下: 0 分, 正常; 1 分, 踝关节有红斑及轻微肿胀; 2 分, 踝关节至跖关节或掌关节有红斑及轻微肿胀; 3 分, 踝关节至掌关节或跖趾关节有红斑及中度肿胀; 4 分, 踝关节至趾关节有红斑及重度肿胀。每只足趾单独评分, 将四肢评分相加作为关节炎评分。建模后第 28 天处死大鼠, 取趾关节行病理切片观察。

1.3 血常规分析

注射 CFA 28 d 后, 眼静脉取血, EDTA-K₂ 抗凝用于血常规分析。血常规分析采用全自动血球分

析仪 (sysmex XT2000i, Japan)。

1.4 统计方法

本组数据均采用 $\bar{x} \pm SD$ 表示, 组间比较采用 *t* 检验, $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 佐剂性关节炎模型

模型组 Wistar 大鼠注射 CFA 后足爪明显肿胀, 出现体重下降、关节变形、皮肤红肿甚至溃烂等症状 (彩插 6 图 1A、B)。AIA 大鼠关节炎评分明显高于正常组的评分, 差异极显著 ($P < 0.01$) (表 1)。病理切片观察发现, 与正常鼠相比, AIA 大鼠关节结构严重受损, 软骨面破坏、局部纤维化, 滑膜组织增生, 关节腔内有大量炎性细胞浸润 (彩插 6 图 1C、1D)。

2.2 血常规分析

AIA 大鼠和正常大鼠的血常规测量结果见表 1。27 个检测指标中, 与正常大鼠相比, AIA 大鼠有 14 个指标有显著性差异 ($P < 0.01$), 分别为白细胞分类计数的 WBC、NEUT (%)、LYMPH%、MONO 和网织红细胞的 RET、HFP、MFP、LFP、IFP 以及红细胞的 MCV、MCH、RDW-SD、RDW-CV。

表 1 AIA 大鼠与正常大鼠血常规指标测定结果 ($n = 10$)

Tab. 1 The blood routine results of AIA and control rats ($n = 10$)

指标 (Indicators)		正常组	模型组
名称 (Names)	单位 (Units)	(Control)	(Model)
红细胞 (RBC)	$10^{12}/L$	7.07 ± 0.37	7.21 ± 0.53
血红蛋白 (HGB)	g/L	149.33 ± 6.38	143.91 ± 10.38
平均血红蛋白量 (MCH)	pg	21.13 ± 0.29	$19.98 \pm 0.57^{**}$
平均血红蛋白浓度 (MCHC)	g/L	331.33 ± 4.46	325.86 ± 8.69
红细胞积压 (HCT)	%	45.10 ± 2.43	44.17 ± 300
红细胞平均体积 (MCV)	fL	63.78 ± 0.88	$61.34 \pm 1.32^{**}$
血小板 (PLT)	$10^9/L$	848.67 ± 347.55	762.71 ± 359.65
平均血小板体积 (MPV)	fL	8.02 ± 0.12	8.13 ± 0.31
血小板压积 (PCT)	%	0.68 ± 0.28	0.62 ± 0.29
血小板分布宽度 (PDW)	%	8.80 ± 0.78	9.21 ± 0.61
大型血小板比率 (P-LCR)	%	11.95 ± 0.29	9.21 ± 0.61
白细胞数 (WBC)	$10^9/L$	12.86 ± 1.81	$17.55 \pm 3.27^{**}$
中性细胞数 (NEUT)	$10^9/L$	1.39 ± 0.27	$4.72 \pm 1.89^{**}$
中性细胞比例	(%)	11.04 ± 2.92	$27.06 \pm 10.23^{**}$
淋巴细胞 (LYMPH)	$10^9/L$	10.77 ± 1.88	11.75 ± 2.89
淋巴细胞比例	%	83.48 ± 2.28	$66.88 \pm 10.56^{**}$
单核细胞 (MONO)	$10^9/L$	0.61 ± 0.20	$0.94 \pm 0.23^{**}$
单核细胞比例	%	4.68 ± 1.07	5.33 ± 1.08
嗜酸性粒细胞 (EO)	$10^9/L$	0.10 ± 0.02	0.11 ± 0.05
嗜酸性粒细胞比例	%	0.76 ± 0.17	0.64 ± 0.31
红细胞分布宽度标准差 (RDW-SD)	%	29.82 ± 1.40	$32.55 \pm 1.48^{**}$
红细胞体积分布宽度变异系数 (RDW-CV)	fL	13.28 ± 0.78	$15.57 \pm 1.28^{**}$
网织红细胞 (RET)	%	0.33 ± 0.02	$0.43 \pm 0.08^{**}$
高荧光强度网织红细胞 (HFR)	%	50.25 ± 1.92	$44.40 \pm 2.78^{**}$
中荧光强度网织红细胞 (MFR)	%	16.45 ± 0.90	$18.55 \pm 1.27^{**}$
低荧光强度网织红细胞 (LFR)	%	33.30 ± 1.72	$37.05 \pm 2.54^{**}$
未成熟网织红细胞 (IRF)	%	66.70 ± 1.72	$62.95 \pm 2.54^{**}$

注: 与正常组比较, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ 。

Note: * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ vs control group.

3 讨论

AIA 大鼠模型广泛应用于 RA 研究,对于抗 RA 药物的发现有重要的作用。然而,对于该模型的血常规研究较少,缺乏相关基础数据。

本研究成功建立了 AIA 大鼠模型,外观可见关节变形、皮肤红肿甚至溃烂等症状,并通过病理切片观察到 AIA 大鼠关节结构严重受损。血常规分析发现,AIA 大鼠的白细胞出现明显变化。与正常大鼠比较,AIA 大鼠 WBC、NEUT、LYMPH 和 MONO 均明显上升,差异极其显著性($P < 0.01$),此结果与史智勇等^[3]研究结果相似。血液中的单核细胞、淋巴细胞、嗜中性粒细胞等白细胞在趋化因子的作用下游出血管,不断向炎症部位聚集,释放氧自由基、细胞因子等物质,参与 RA 的发展^[4]。本研究结果进一步说明,与人类相似,白细胞参与并介导 AIA 大鼠关节炎的形成与发展。在疾病活动期,类风湿性关节炎患者血小板计数会明显升高,甚至达到正常值的 1~2 倍^[5]。与人的类风湿性关节炎不同,本组 AIA 大鼠血小板无明显变化,这可能与 AIA 模型的发病机制和进程不同有关。

MCV、MCH 的显著降低,提示 AIA 大鼠出现慢性病性贫血(anemia of chronic disease, ACD),这与人的类风湿性关节炎相似。贫血是 RA 常见的一种关节外表现,30% 左右的类风湿性关节炎患者会出现 ACD^[6],其病理机制较为复杂,主要与细胞因子有关。肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor α , TNF- α),白介素-1(interleukin-1, IL-1),白介素-6(IL-6),干扰素- γ (interferon- γ , INF- γ)等细胞因子和 NO 等炎症介质可以抑制骨髓红系造血,

促进骨髓红系前体细胞凋亡,减少促红细胞生成素的分泌,促使铁代谢异常^[7]。研究表明,AIA 大鼠血清及炎症部位的 TNF- α 、IL-1、IL-6、INF- γ 和 NO 等与 RA 相关的细胞因子及炎症介质均有不同程度的升高^[8],提示 AIA 大鼠贫血机制可能与人类相同。网织红细胞出现明显升高,说明 AIA 大鼠的骨髓造血功能增强,进一步提示 AIA 大鼠有类似人类类风湿性关节炎的 ACD 症状。

综上所述,AIA 大鼠白细胞明显上升,会出现类似于人类类风湿性关节炎的慢性病性贫血。AIA 大鼠可以用于模拟人的类风湿性关节炎伴贫血病。

参考文献:

- [1] 刘元刚,刘树滔,饶平凡. 类风湿性关节炎啮齿动物模型的研究进展[J]. 中国实验动物学报,2007,15(6):470-473.
- [2] 魏伟,吴希美,李元建. 药理实验方法学[M]. 北京:人民卫生出版社,2010:749-757.
- [3] 史智勇,朱发仁,王风琴,等. 实验性关节炎大鼠的血液常规测定值[J]. 上海实验动物科学,1999,19(3):169-171.
- [4] Szekanecz Z, Koch AE, Kunkel SL, et al. Cytokines in rheumatoid arthritis: potential targets for pharmacological intervention[J]. Drugs Aging, 1998,12:377-390.
- [5] 白洲霞. 类风湿性关节炎实验室检测指标的分析探讨[J]. 甘肃中医学院学报,2006,23(3):50-52.
- [6] 李振玲. 类风湿性关节炎贫血机制研究进展[J]. 中日友好医院学报,2005,19(3):175-178.
- [7] 王亮,卓光生. 类风湿性关节炎血液学改变机制的研究进展[J]. 医学综述,2006,12(4):205-206.
- [8] 田俊阁,卢伟伟,平立峰. 中药对佐剂性关节炎大鼠细胞因子影响的研究进展[J]. 现代中西医结合杂志,2009,18(30):3774-3776.

[修回日期]2013-12-08