· 基础研究 ·

人参皂苷化合物 K 乙酰化衍生物的合成及分析[△]吕静¹, 李珂珂², 李争宁¹, 弓晓杰^{2*}, 陈丽荣¹, 魏汉莲³

(1. 大连大学 环境与化学工程学院, 辽宁 大连 116622; 2. 大连大学 医学院, 辽宁 大连 116622;

3. 辽宁政法职业学院 食品药品安全系, 辽宁 沈阳 110161)

[摘要] **目的:** 研究人参皂苷化合物 K 乙酰化衍生物的合成及产物结构, 建立其高效液相分析方法。**方法:** 采用对葡萄糖基 6-位保护-去保护的方法, 得到除糖基 6-位未乙酰化的化合物 K 衍生物 1c; 利用一维核磁(1D NMR)、二维核磁(2D NMR)及质谱(MS)方法对合成产物 1c 进行结构鉴定; 利用反相高效液相色谱, 建立了人参皂苷化合物 K 乙酰化衍生物 1c 的分析方法。**结果:** 人参皂苷化合物 K 乙酰化产物 1c 的得率为 46.4%, 在高效液相色谱中与其他杂质的分离度较好, 分析时间在 45 min 以内。**结论:** 首次采用人参皂苷化合物 K 葡萄糖基 6-羟基保护的路线, 合成其乙酰化衍生物 1c, 并归属了衍生物的 NMR 数据。采用 HPLC 可以快速高效地进行人参皂苷化合物 K 乙酰化衍生物的分析。

[关键词] 人参皂苷化合物 K; 乙酰化; 高效液相

Synthesis of ginsenoside compound K acetylated derivative and HPLC analysisLYU Jing¹, LI Keke², LI Zhengning¹, GONG Xiaojie^{2*}, CHEN Lirong¹, WEI Hanlian³

(1. College of Environmental and Chemical Engineering, Dalian University, Dalian 116622, China;

2. College of Medical, Dalian University, Dalian 116622, China;

3. Department of food and drug safety, Liaoning vocational college of political science and law, Shenyang 110161, China)

[Abstract] **Objective:** To synthesize and structural analyze ginsenoside compound K acetylated derivative, and establish a HPLC method for the derivative. **Methods:** Using the protection-deprotection strategy on the 6-OH of glucosyl, ginsenoside compound K derivatives 1c was synthesized with acetylated except 6-OH of glucosyl, and the structure of 1c was identified by 1D NMR, 2D NMR and MS. The analysis method of the end-product was established by RP-HPLC-DAD, and optimized. **Results:** Taking all the three steps of the synthesis of 1c into account, the yield was 46.4%. In the end-product, 1c showed good separation with other impurity substances, the analysis time of 1c was less than 45 minutes. **Conclusion:** Using the protection strategy on the 6-OH of glucosyl, we synthesized compound K acetylated derivatives for the first time, and provided the comprehensive NMR data. The HPLC method can provide a rapid and efficient method to determination of the end-product.

[Keywords] Ginsenoside compound K; acetylated; HPLC

doi:10.13313/j.issn.1673-4890.2015.5.005

人参作为一种传统中药, 在中国、韩国、日本等被广泛应用, 其主要活性成分是人参皂苷。人参皂苷具有广泛的药理活性, 如抗肿瘤、抗炎、抗糖尿病等^[1-2]。近年来, 人参皂苷化合物 K 由于独特的生物活性引起了广泛关注, 其为口服人参后肠道菌群代谢的主要产物之一, 能够抑制人结肠癌及肝癌

细胞增殖, 并诱导其凋亡^[3-4], 具有较好的抗炎作用^[5]。20 世纪日本学者研究发现, 肠道菌群的代谢物化合物 K 及其脂肪酸酯类化合物是人参发挥实际药效的成分^[6-8]。众多学者针对这一理论, 开展了合成人参皂苷衍生物的研究^[9-10], 从而改善分子结构, 提高其活性作用。目前, 通过选择性保护策略, 合

[△]**[基金项目]** 国家自然科学基金(81172949); 辽宁省教育厅科学技术研究一般研究项目(L2012439); 辽宁省优秀人才支持计划(LR2013058); 辽宁省科技厅科学技术计划项目(2014204007); 大连市科技局科技计划项目(2014E12SF071)

***[通信作者]** 弓晓杰, 教授, 硕士生导师, 研究方向: 中药新药开发; E-mail: gxjclr@163.com

成了多种化合物 K 的酯化产物,与底物相比,其抗肿瘤作用显著提高^[11-13]。

本文采用选择性保护-去保护的策略,合成了除葡萄糖基 6-位外的全乙酰化产物,利用 NMR 对其结构做了详细表征,并通过反相高效液相色谱法,定性分析了终产物的构成,为化合物 K 的结构修饰和产物分析提供了新思路。

1 仪器、试剂和材料

1.1 仪器

高效液相色谱仪(分析型 Agilent 1260);制备型 LC 3000(北京创新通恒科技有限公司);电子天平(上海梅特勒-托利多仪器有限公司);ETS-D4 加热磁力搅拌器(德国 IKA 公司);核磁共振仪 Bruker AVANCE DRX-500 型(Bruker 公司,¹H-NMR 400 MHz/¹³C-NMR 100 MHz, TMS 内标);LC-MS-2010EV 电喷雾离子阱质谱仪(日本 Shimadzu)。

1.2 试剂

甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、石油醚、三乙胺、氯化铵、乙酸酐、四氢呋喃、碳酸氢钠、无水亚硫酸钠、叔丁基二苯基氯硅烷、四丁基氟化铵(分析纯,中国化工集团);甲醇(色谱纯,美国 TEDIA);水为超纯水。

1.3 材料

人参皂苷化合物 K(大连富生天然药物有限公

司,批号:20100321)经 NMR 及 MS 测定纯度为 98%;硅胶(200-300 目,青岛海洋化工厂)。

2 方法和结果

2.1 衍生物的合成

2.1.1 化合物 K 葡萄糖基 6-羟基的保护 在装有电磁搅拌器的 25 mL 休良克瓶中,加入化合物 K 100 mg (0.160 5 mmol)(**1**),用 1 mL 三乙胺溶解,氮气保护,冰水浴下加入叔丁基二苯基氯硅烷(TBDPSCI) 210 μ L(0.802 7 mmol),反应 10 min 后,升至室温,薄层色谱法监测反应进程。12 h 反应完毕后,加入饱和氯化铵溶液停止反应。反应产物用二氯甲烷萃取(每次 5 mL,共 3 次),Brine 洗有机相,无水硫酸钠(Na_2SO_4)干燥,浓缩溶剂,柱层析纯化(甲醇-二氯甲烷洗脱)后得到产物 **1a** 125 mg。

2.1.2 化合物 K 羟基乙酰化 在装有电磁搅拌器的 25 mL 休良克瓶中,加入 100 mg(0.116 1 mmol)化合物 K 的葡萄糖基 6-羟基的保护产物 **1a** 和 0.7 mg (0.005 8 mmol)4-二甲氨基吡啶,用 2 mL 三乙胺溶解,氮气保护,冰水浴下加入乙酸酐 219 μ L (2.322 mmol),反应 10 min 后,升至室温,薄层色谱法监测反应进程,24 h 反应完毕后,加入饱和碳酸氢钠(NaHCO_3)溶液停止反应。反应产物用二氯甲烷萃取(每次 5 mL,共 3 次),Brine 洗有机相,无水 Na_2SO_4 干燥,浓缩溶剂,柱色谱纯化(乙酸乙酯-石油醚洗脱)后得到产物 **1b** 101 mg。

图1 人参皂苷化合物 K 乙酰化衍生物的合成路线

2.1.3 化合物 K 乙酰化衍生物的合成 将 65 mg 上述人参皂苷化合物 K 的硅醚全乙酰化产物 **1b** 65 mg (0.060 7 mmol), 加入到 50 mL 的圆底烧瓶中, 用 2 mL 无水四氢呋喃溶解, 冰水浴下加入四丁基氟化铵 (TBAF) 18 μ L (0.060 7 mmol), 反应 30 min 后升至室温, 薄层色谱检测反应进程。反应 8 h 后完成, 减压浓缩除掉四氢呋喃, 加入等体积乙酸乙酯和水共 2 mL 溶解。反应产物用乙酸乙酯萃取 (每次 5 mL, 共 3 次), Brine 洗有机相, 无水 Na_2SO_4 干燥, 浓缩溶剂, 柱色谱纯化 (乙酸乙酯-石油醚洗脱) 后得到化合物 K 乙酰化衍生物 **1c** 32 mg。合成路线图见图 1。

2.2 化合物 K 乙酰化衍生物的结构解析

1a: 乳白色粉末。ESI-MS: m/z 883.5501 ($\text{C}_{52}\text{H}_{80}\text{NaO}_8\text{Si} [\text{M} + \text{Na}]^+$; 计算值 883.5520)。 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.68 (4H, m), 7.39 (6H, m), 4.53 (1H, d, $J = 6.1$ Hz, H-glc-1), 5.11 (1H, t, $J = 5.7$ Hz, H-24); $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 苯环上碳, 135.5 (2 个 C)、133.1 (4 个

C)、129.6 (4 个 C)、127.7 (2 个 C); 131.2 (C-25); 124.7 (C-24); 96.9 (C-glc-1); 73.4 (C-glc-2); 78.8 (C-glc-3); 71.1 (C-glc-4); 75.6 (C-glc-5); 64.3 (C-glc-6)。

1b: 乳白色粉末。ESI-MS: m/z 1093.6042 ($\text{C}_{62}\text{H}_{90}\text{NaO}_{13}\text{Si} [\text{M} + \text{Na}]^+$; 计算值 1093.6048)。 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 4.50 (1H, d, $J = 7.8$ Hz, H-glc-1), 5.14 (1H, t, $J = 7.7$ Hz, H-24), 7.66 (4H, m), 7.37 (6H, m); $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 苯环上碳, 135.7 (2 个 C)、133.2 (4 个 C)、129.7 (4 个 C)、127.7 (2 个 C); 131.3 (C-25); 124.6 (C-24); 94.7 (C-glc-1); 73.8 (C-glc-2); 75.3 (C-glc-3); 68.8 (C-glc-4); 74.4 (C-glc-5); 62.8 (C-glc-6)。

1c: 乳白色粉末。ESI-MS: m/z 855.4864 ($\text{C}_{46}\text{H}_{72}\text{NaO}_{13} [\text{M} + \text{Na}]^+$; 计算值 855.4871)。 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 400 MHz) 和 $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3 , 100 MHz)。见表 1。

表 1 人参皂苷化合物 K 乙酰化衍生物 **1c** 的 ^1H 和 $^{13}\text{C-NMR}$ 数据 (400 MHz in CDCl_3)

No	δ_{H}	δ_{C}	No	δ_{H}	δ_{C}
1	1.11(1H, m), 1.64(1H, m)	38.5	22	1.84(1H, m), 1.53(1H, m)	39.1
2	1.59(1H, m), 1.65(1H, m)	23.6	23	1.98(1H, m), 1.90(1H, m)	22.8
3	4.48(1H, dd, 8.7, 3.8)	80.7	24	5.02(1H, t, 7.4)	124.6
4	-	37.9	25	-	131.4
5	0.85, 0.83(1H, d, 9.0)	55.9	26	1.65(3H, s)	25.6
6	1.55(2H, m)	18.2	27	1.59(3H, s)	17.7
7	1.44(1H, m), 1.30(1H, m)	34.5	28	0.87(3H, s)	28.0
8	-	39.6	29	0.85(3H, s)	16.5
9	1.52(1H, m)	49.9	30	0.92(3H, s)	18.0
10	-	37.0	1'	4.65(1H, d, 6.6)	94.7
11	1.17(1H, m), 1.84(1H, m)	29.1	2'	4.86(1H, ddd, 9.9, 5.5, 3.2)	71.9
12	4.82(1H, td, 10.2, 4.8)	75.2	3'	5.00(1H, t, 7.2)	76.3
13	1.92(2H, m)	45.6	4'	3.56(1H, dd, 9.7, 7.2)	69.4
14	-	53.1	5'	3.49(1H, dd, 9.8, 7.4)	73.8
15	1.52(1H, m), 1.02(1H, m)	31.7	6'	4.32(2H, dd, 9.6, 2.4)	63.5
16	1.77(2H, m)	26.4	2'-COOCH ₃		169.2 ^a
17	2.07(1H, m)	47.8	3'-COOCH ₃		171.5 ^a
18	0.96(3H, s)	15.5	4'-COOCH ₃		171.4 ^a
19	0.85(3H, s)	16.2	3-COOCH ₃		170.9 ^a
20	-	83.1	12-COOCH ₃		170.3 ^a
21	1.17(3H, s)	21.9			

注: COOCH₃ 中甲基的 ^1H 和 $^{13}\text{C-NMR}$ 信号重叠严重, 较难归属连接位置, δ_{C} 20.7 (δ_{H} 2.08), δ_{C} 20.8 (δ_{H} 2.07), δ_{C} 20.8 (δ_{H} 2.05), δ_{C} 21.3 (δ_{H} 2.03), δ_{C} 21.8 (δ_{H} 1.97)。

2.3 化合物 K 乙酰化衍生物 **1c** 高效液相色谱条件的确定

2.3.1 色谱柱的选择 分别采用 Agilent C₁₈ 不同长度及型号的色谱柱进行合成产物的分离试验。综合结果, 本试验选用 Zorbax Eclipse XDB-C18 (250 mm × 4.6 mm, 5 μm) 色谱柱, 可以达到较好的色谱分离效果。

2.3.2 检测波长的选择 产物 **1c** 采用 DAD 检测器进行, 190 ~ 400 nm 检测时, 发现在 203 nm 下有最大吸收^[14]。因而采用 203 nm 作为检测波长。

2.3.3 流动相的选择 根据产物 **1c** 的结构特征, 在乙腈-水体系和甲醇-水体系之间进行了筛选。从分离度和峰形来看, 70% 乙腈-水体系较适合作为分离含有 **1c** 的合成产物的流动相。

2.3.4 柱温的选择 考查了不同温度下的衍生物分离度, 结果发现, 柱温为 25 °C 时分离效果较好。

2.4 化合物 K 乙酰化衍生物 **1c** 高效液相色谱分析

将上述 2.1.3 合成的终产物, 在未经硅胶柱色谱纯化时制备成质量浓度为 5.0 mg·mL⁻¹ 的甲醇溶液, 利用高效液相色谱分析其产物情况。终产物经 0.45 μm 微孔滤膜过滤后, 采用 2.3 的色谱条件, 进样 10 μL, 得到了含 **1c** 合成产物色谱图, 见图 2。

图2 人参皂苷化合物 K 乙酰化衍生物的液相色谱图

从色谱图中可以看出, 脱保护基后的产物有 6 个, 其中第 4 号出峰即为目标产物 **1c**。根据峰面积百分比计算法, 其占产物含量的 23.5%。见表 2。

2.5 化合物 K 乙酰化衍生物 **1c** 合成产率的计算

投入人参皂苷化合物 K 100 mg, 分离纯化后得到 **1a** 125 mg, 可以得出第一步反应的产率为 90.4%。第二步乙酰化反应投入 **1a** 100 mg, 分离纯化后得到目标产物 **1b** 101 mg, 产率为 81.4%。最后脱保护基的反应投入 **1b** 65 mg, 分离纯化后得到乙酰化产物 **1c** 32 mg, 脱保护反应产率为 63%。综合以上 3 步反应, 合成化合物 K 乙酰化衍生物 **1c** 的总

得率为 46.4%。

表2 人参皂苷化合物 K 乙酰化衍生物合成产物的出峰时间及相应峰面积百分比

组分编号	出峰时间/min	峰面积(%)
1	7.9	32.8
2	13.0	2.3
3	13.9	7.3
1c	18.1	23.5
4	27.3	9.3
5	40.5	24.7

3 讨论

本论文为了达到选择性保护伯羟基的目的, 设计了使用硅烷保护基保护的方案, 流程为保护-全乙酰化-脱保护。该方法反应条件温和, 选择性好, 反应底物无毒性, 大大地降低了分离的难度, 为后续试验提供方法和依据。

产物 **1c** 的 5 个乙酰基中各个甲基的氢谱和碳谱数据通过异核单量子相干相关谱(HSQC)得到了较好的指认, 但其取代位置由于信号重叠严重, 在异核多键相关谱(HMBC)中较难归属清楚, 因此未指定具体连接位置。

综上, 本文通过对葡萄糖基 6-位选择性保护的策略, 首次高效率地合成了化合物 K 乙酰化衍生物, 并通过 NMR 详细归属了其氢谱和碳谱数据。利用 HPLC 对终产物的组成进行了定性分析, 建立的分析方法可以用于目标产物的分离纯化。本文在终产物的纯化中利用了硅胶柱色谱, 在今后大量制备中, 为减小损失量并提高纯度, 可以参考此方法用于 HPLC 制备分离。

参考文献

- [1] Choi K T. Botanical characteristics, pharmacological effects and medicinal components of Korean Panax ginseng C. A. Meyer [J]. Acta Pharmacol Sin, 2012, 29(9): 1109-1118.
- [2] Sathishkumar N, Sathiyamoorthy S, Ramya M, et al. Molecular docking studies of anti-apoptotic BCL-2, BCL-XL, and MCL-1 proteins with ginsenosides from Panax ginseng [J]. J Enzyme Inhib and Med Chem, 2012, 27(5): 685-692.
- [3] Oh S H, Lee B H. A ginseng saponin metabolite-induced apoptosis in HepG2 cells involves a mitochondria-mediated

(下转第 439 页)

- 2010,132(10):483-490.
- [4] Dias T, Liu B, Jones P, et al. Cytoprotective effect of *Coreopsis tinctoria* extracts and flavonoids on tBH Pand cytokine-induced cell injury in pancreatic MIN6 cells [J]. J Ethnopharmacol, 2012, 139(23):485-492.
- [5] 明婷, 孙玉华, 胡梦颖, 等. 金鸡菊提取物降压及体内抗氧化作用的研究 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2012, 18(10):249-252.
- [6] 梁淑红, 哈木拉提, 庞市宾, 等. 金鸡菊提取物降血压化学成分实验研究 [J]. 时珍国医国药, 2011, 21(7):1619-1621.
- [7] 梁淑红, 庞市宾, 刘晓燕, 等. 金鸡菊提取物降血脂作用的研究 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2010, 31(8):495-498.
- [8] 曹燕, 庞市宾, 徐磊, 等. 金鸡菊提取物体外抗氧化活性 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17(12):144-147.
- [9] Zălaru C, Crișan C C, Călinescu I, et al. Polyphenols in *Coreopsis tinctoria* Nutt. fruits and the plant extracts antioxidant capacity evaluation [J]. Central Eur J Chem, 2014, 12(8):858-867.
- [10] Zhang Y, Shi S P, Zhao M B, et al. A novel chalcone from *Coreopsis tinctoria* Nutt. [J]. Biochem Syst Ecol, 2006, 34(10):766-769.
- [11] 赵军, 孙玉华, 徐芳, 等. 昆仑雪菊黄酮类成分研究 [J]. 天然产物研究与开发, 2013, 25(3):50-52.
- [12] 张兰兰, 孙玉华, 哈木拉提, 等. HPLC 测定金鸡菊中金鸡菊查尔酮含量 [J]. 中国中医药信息杂志, 2012, 19(7):48-49.
- [13] 李帅, 匡海学, 冈田嘉仁, 等. 鬼针草有效成分的研究 (II) [J]. 中草药, 2004, 35(9):972-975.
- [14] Sun Y, Yuan H, Hao L, et al. Enrichment and antioxidant properties of flavone C-glycosides from trollflowers using macroporous resin [J]. Food Chem, 2013, 141(1):533-541.

(收稿日期 2014-08-07)

(上接第434页)

- pathway and its downstream caspase-8 activation and Bid cleavage [J]. Toxicol Appl Pharmacol, 2004, 194(3):221-229.
- [4] Zhang Z, Du G J, Wang C Z, et al. Compound K, a ginsenoside metabolite, inhibits colon cancer growth via multiple pathways including p53-p21 interactions [J]. Inter J Mol Sci, 2013, 14(2):2980-2995.
- [5] Joh E H, Lee I A, Jung I H, et al. Ginsenoside Rb₁ and its metabolite compound K inhibit IRAK-1 activation-The key ste Pof inflammation [J]. Biochem Pharmacol, 2011, 82(3):278-286.
- [6] Hasegawa H, Lee K S, Nagaoka T, et al. Pharmacokinetics of ginsenoside deglycosylated by intestinal bacterial and its transformation to biologically active fatty esters [J]. Biol Pharm Bull, 2000, 23(3):298-304.
- [7] Hasegawa H, Suzuki R, Nagaoka T, et al. Prevention of growth and metastasis of murine melanoma through enhanced natural-killer cytotoxicity by fatty acid-conjugate of protopanaxatriol [J]. Biol Pharm Bull, 2002, 25(7):861-866.
- [8] Hasegawa H. Proof of the mysterious efficacy of ginseng: basic and clinical trials; metabolic activation of ginsenoside: deglycosylation by intestinal bacteria and esterification with fatty acid [J]. J Pharmacol Sci, 2004, 95(2):153-157.
- [9] Liu J H, Chen D K, Liu P, et al. Discovery, synthesis, and structure-activity relationships of 20(S)-protopanaxadiol (PPD) derivatives as a novel class of AMPK α 2 β 1 γ 1 activators [J]. Eur J Med Chem, 2014, 79:340-349.
- [10] Mathiyalagan R, Subramaniam S, Kim Y J, et al. Ginsenoside compound K-bearing glycol chitosan conjugates: Synthesis, physicochemical characterization and in vitro biological studies [J]. Carbohydr Polym, 2014, 112:359-366.
- [11] Li W F, Li Z N, Chen L R, et al. Synthesis and structural analysis of mono-dodecanoic acid esters of ginsenoside M1 [J]. Chin J Nat Med, 2011, 9(3):199-203.
- [12] Li W F, Chen L R, Gong X J, et al. Synthesis of esters of ginsenoside metabolite M1 and their cytotoxicity on MGC80-3 cells [J]. Molecules, 2013, 18(4):3689-3702.
- [13] 肖景楠, 李珂珂, 李争宁, 等. 人参皂苷 M1 异丁酸酯衍生物的合成及高效液相分析和制备 [J]. 中国现代中药, 2014, 16(5):368-372.
- [14] 郑长龙, 鱼红闪, 金凤燮. 人参稀有皂苷 C-K 的分离与纯化 [J]. 大连工业大学学报, 2003, 22(3):167-169.

(收稿日期 2015-04-10)